

296 Calandria común



Calandria común. Adulto (27-VII).

CALANDRIA COMÚN (*Melanocorypha calandra*)

IDENTIFICACIÓN

18-20 cm. Partes superiores de color pardo, con bordes claros; cabeza sin cresta, con una ceja marcada y pico grueso y fuerte; pecho de tonos ocre, finamente listado y con dos manchas laterales negras en forma de cuerno; alas con los bordes de las secundarias de color blanco y plumas infracoberteras oscuras. Los **juveniles** tienen ribetes blancuzcos en las plumas corporales y del ala y con las manchas negras del cuello poco conspicuas.

ESPECIES SIMILARES

Sólo la **terrera común** muestra dos manchas en el cuello, pero es de tamaño menor y no tiene el borde del ala con una línea blanca.



Terrera común

SEXO

Sexos similares, no siendo posible diferenciarlos por el plumaje. Existe diferencia de tamaño: **macho** con ala mayor de 126 mm.; **hembra** con ala menor de 122 mm.

EDAD

Pueden reconocerse 2 tipos de edad:

Juveniles con las plumas nuevas, con borde claro alrededor.

Adultos sin borde claro en las plumas alares, que se muestran desgastadas.

Después de la muda **posnupcial/postjuvenil** no es posible datar la edad utilizando el plumaje.

MUDA

Muda **postnupcial** y **postjuvenil** completa, que suele estar terminada a mediados de agosto la primera y extenderse en algunos individuos hasta noviembre, la segunda.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Sedentaria. Presente en todas las grandes llanuras del Valle del Ebro y del Sistema Ibérico.



Calandria común. Juvenil (06-VII)



Calandria común. Diseño de la cabeza: arriba adulto (07-VII); abajo juvenil (06-VII)

296 Calandria común




Calandria común. Diseño del pecho: arriba adulto (07-VII); abajo juvenil (06-VII)



Calandria común. Diseño de la cola: izquierda adulto (07-VII); derecha juvenil (06-VII)



Calandria común. Diseño del dorso: izquierda adulto (07-VII); derecha juvenil (06-VII)



Calandria común. Adulto: diseño del ala (07-VII).



Calandria común. Juvenil: diseño del ala (06-VII)



Calandria común. Color de las patas: izquierda adulto (07-VII); derecha juvenil (06-VII)